Apixaban Medical Valley
(apiksaban)
Pasientkort

Dette kortet skal du/barnet/omsorgspersonen ha med seg til enhver tid

Vis dette kortet til apoteket, tannlegen din og annet helsepersonell før behandling.

Jeg står på antikoagulasjonsbehandling med Apixaban Medical Valley (apiksaban) for å forebygge blodpropp.

Vennligst fyll ut denne delen eller be legen om å gjøre det

Navn:

Fødselsdato:

Indikasjon:

Vekt:

Dose: mg to ganger daglig

Legens navn:

Legens telefonnummer:

Informasjon til pasienter/omsorgspersoner

- Ta/gi Apixaban Medical Valley regelmessig som du har fått beskjed om. Dersom du glemmer å ta/gi en morgendose, ta den så snart du husker, og den kan tas/gis sammen med kveldsdosen. En glemt kveldsdose kan bare tas/gis i løpet av samme kveld. Ikke ta/gi to doser neste morgen, men fortsett i stedet å følge doseringsplanen to ganger daglig som anbefalt neste dag.

- Ikke avbryt behandling med Apixaban Medical Valley uten å ha snakket med lege, da det er en risiko for at du/pasienten kan få slag/blodpropp eller andre komplikasjoner.
- Apixaban Medical Valley hjelper til med å fortynne blodet ditt. Dette kan imidlertid føre til økt risiko for blødning.
- Tegn og symptomer på blødning inkluderer blåmerker eller blødninger under huden, tjærefarget avføring, blod i urinen, neseblod, svimmelhet, trøtthet, blekhet eller slapphet, plutselig alvorlig hodepine, opphosting av blod og oppkast av blod.

- Dersom blødningen ikke stopper av seg selv, **ta kontakt med lege/legevakt øyeblikkelig.**
- Dersom du/pasienten skal opereres eller gjennomgå annen invasiv behandling, informer legen om at du/pasienten bruker Apixaban Medical Valley.

[Jun 2026, version 1.0]

Informasjon til helsepersonell

- Apixaban Medical Valley (apiksaban) er et oralt antikoagulantia som virker direkte ved selektiv hemming av faktor Xa.

- Apixaban Medical Valley kan øke risikoen for blødning. Dersom en alvorlig blødning oppstår, skal Apixaban Medical Valley seponeres umiddelbart.
- Behandling med Apixaban Medical Valley krever ikke rutinemessig overvåking av eksponering. En kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse kan være nyttig i helt spesielle tilfeller, f.eks. overdose og akuttkirurgi (protrombintid (PT), internasjonalt standardisert skala (INR) og aktivert partiell tromboplastintid (aPTT) koagulasjonstester anbefales ikke) – se SPC.

- Et middel som reverserer anti-faktor Xa-aktiviteten til apiksaban er tilgjengelig for voksne, men middelets sikkerhet og effekt er imidlertid ikke fastslått hos pediatriske pasienter (se preparatomtalen for andeksanet alfa).